

PRÉPARATION POUR LES EXAMENS DE RADIOLOGIE

FAX	TÉL.	EXAMEN	NPO	VOIE IV	BILAN SANGUIN	CONS.	ANEST.	PARTICULARITÉS	GÉNÉRALITÉS
SCAN									
55025	24540	ANGIOSCAN		BS # 18*	creat (dfge)			Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE.	<p>Transport : Usager en jaquette sur civière ou en fauteuil roulant, <u>seulement si se mobilise bien seul</u>, sauf biopsie et drainage toujours sur civière.</p> <p>FADM obligatoire : au dossier <u>si préparation à l'iode ou préparation rénale.</u></p> <p>COAG : INR-PT-PTT : Aviser MD si INR > 1.5.</p> <p>Préparation rénale par md si : Pt non diabétique avec DFGE <45. Pt diabétique avec DFGE <60.</p> <p>LÉGENDE :</p> <p>*VOIE IV : Enlever pompe si possible. Aucun soluté avec additif. Si soluté en cours; mettre rallonge. Power Picc Line OK pour tous les examens (sauf angioscan pulmonaire).</p> <p>**ANEST. : Sédation-analgésie.</p>
		BIOPSIE		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO (doit être prescrit par md).	
		DRAINAGE		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Envoyer contenants + étiquettes demandés par md. Cesser ACO (doit être prescrit par md).	
		ENTÉROSCAN (GRÊLE)	6h avant	BS # 18*	creat (dfge)			1 hre avant examen : Boire le liquide (remis par radiologie) en 4 étapes. Boire la 1 ^{re} bouteille de 450ml en 20 min. Boire la 2 ^e bouteille de 450ml en 20 min. La 3 ^e bouteille sera divisée en deux, soit ½ bouteille de 225ml à boire en 20 minutes et l'autre ½ bouteille de 225ml sera bue à la salle de scan. Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE.	
		PYÉLOSCAN		BS #18-20*	creat (dfge)			½ hre pré examen : Boire 500ml d'eau ou soluté TVO si ne peut pas boire. Ne pas uriner. Si sonde, la clamper. Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE.	
		SCAN ABDO / PELV		BS # 18-20*	creat (dfge)			1 hre pré scan : 1 litre d'eau ou 1 litre de gastrographin. Si post-op ou r/o d'abcès : 2 bouteilles de Readi-Cat (disponible à la pharmacie). Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE.	
		SCAN CÉRÉBRAL / THORACIQUE		BS # 18-20 si C+*	creat (dfge)			Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE.	
		UROSCAN							
ANGIO									
55025	23853	ANGIOGRAPHIE	déjeuner léger	soluté TVO + rallonge*	creat (dfge) coag. Si Aco	Oui	locale **	Rasage aines. Cesser ACO (doit être prescrit par MD). Cesser héparine IV selon ordonnance du md 4h à 6h pré angio. H ₂ O permise avec médicament (HTA, cœur). Vider vessie. Préparation si allergie à iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE. (Pt non diabétique avec DFGE < 45. Pt diabétique avec DFGE <60).	<p>Transport : Usager en jaquette sur civière. Sauf Picc line OK <u>en fauteuil roulant si se mobilise bien seul</u>.</p> <p>FADM obligatoire : au dossier <u>si préparation à l'iode ou préparation rénale.</u></p> <p>VOIE IV : Enlever pompe si possible. Rallonge pour tout soluté.</p> <p>COAG : INR-PT-PTT : aviser md si INR >1.5.</p> <p>LÉGENDE :</p> <p>*VOIE IV : Enlever pompe si possible. Aucun soluté avec additif. Si soluté en cours; mettre rallonge. Power Picc Line OK pour tous les examens (sauf angioscan pulmonaire).</p> <p>**ANEST. : Sédation-analgésie.</p>
		DRAINAGE VOIES BILIAIRES		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO – Préparation si allergie lode (OC-075)	
		FILTRE VCI		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Rasage aines. Préparation si allergie à l'iode (OC-075).	
		RETRAIT FILTRE VCI		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Préparation si allergie à l'iode (OC-075).	
		GASTRO - JÉJUNOSTOMIE	6h avant	soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO (doit être prescrit par md). Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Usager doit avoir levine en place (doit être prescrit par md). Cesser gavage 6h avant (doit être prescrit par md).	
		NPC (néphrotomie per cutanée) DOUBLE J		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO (doit être prescrit par md). Préparation si allergie à l'iode (OC-075).	
		PERM – CATH / port-o-cath	déjeuner léger	BS (permcath) Soluté + rallonge (P-O-C)*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO (doit être prescrit par md). Préparation si allergie à l'iode (OC-075). En cas d'infection ou demande d'analyse de pus ou autres liquides : envoyer contenants et étiquettes.	
		PICC - LINE			Non	Oui	locale **		
PONCTION PLEURALE / ASCITE (Bx-Drain)		soluté + rallonge*	coag.	Oui	locale **	Cesser ACO (doit être prescrit par md). En cas d'infection ou demande d'analyse de pus ou autres liquides : envoyer contenants + étiquettes. Si drain thoracique : envoyer bouteille Thoraseal + 2 pinces hémostatiques.			

PRÉPARATION POUR LES EXAMENS DE RADIOLOGIE

FAX	TÉL.	EXAMEN	NPO	VOIE IV	BILAN SANGUIN	CONS.	ANEST.	PARTICULARITÉS	GÉNÉRALITÉS	
RADIOGRAPHIE / SCOPIE										
55025	23852	CYSTOGRAPHIE						Pt doit arriver avec sonde en place.	Transport : Usager en jaquette sur civière ou en fauteuil roulant <u>seulement si se mobilise bien seul.</u> FADM obligatoire au dossier <u>si préparation à l'iode ou préparation rénale.</u>	
		GORGÉE BARYTÉE GRÊLE (intestin) REPAS BARYTÉ	À minuit					Ne pas fumer – Ne pas mâcher de gomme – Pas de médication PO		
		LAVEMENT BARYTÉ	À minuit					La veille de l'examen : À partir de 14h00 : cesser de consommer aliments solides. 4 hres avant examen : ingestion seulement de liquides clairs. À 16h00: Prendre 4co Bisacodyl (doit-être prescrit par md). De 16h00 à 20h00 diluer Colyte et boire à raison de 250ml/15 minutes (doit-être prescrit par md). Eau avec médication permis le matin de l'examen.		
		PEV (PYÉLOGRAPHIE ENDOVEINEUSE)		Bouchon salin	creat (dfge)			Faire uriner pt avant examen. Préparation si allergie à l'iode (OC-075). Préparation rénale par md selon DFGE. (Pt non diabétique avec DFGE < 45. Pt diabétique avec DFGE < 60).		
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE										
55024	24391	ANGIO RÉSONANCE			creat			Questionnaire : à compléter et à signer par le md des 2 côtés. Voie IV : POMPE INTERDITE. <u>Si patient sous héparine IV ou autre perfusion nécessitant une pompe, un ordre verbal téléphonique du md est obligatoire pour une CAT pour la perfusion avant l'examen.</u> À NOTER : Aucune préparation rénale pour les examens en IRM avec injection de colorant, sauf si avis du md.	Transport : Usager en jaquette (sans bouton Pression) sur civière ou en fauteuil roulant <u>seulement si se mobilise bien seul.</u> Aucun métal : PAS DE POMPE, pas de pacemaker,* pas de jaquette à bouton pression. LÉGENDE : <i>*Certains pacemakers sont compatibles en IRM, vérifier auprès du coordonnateur, si tel est le cas.</i>	
		ANGIO RÉSONANCE ABDO	4h avant		creat					
		BIOPSIE : SEINS			INR, si Héparine					
		CARDIAQUE								
		MRCP (IRM VOIES BILIAIRES)	4h avant	Bouchon salin						
		RÉSON. MAGN. (IRM)			creat					
RÉSON. MAGN. ABDO/PELV/FOIE/REINS	4h avant		creat							
ÉCHOGRAPHIE										
55025	23237	ÉCHO ABDOMINALE	4h avant					Transport : Usager en jaquette sur civière. 1h avant : Boire 500ml d'eau ou soluté TVO si ne peut pas boire. Ne pas uriner. Si sonde, la clamber. 1h avant : Boire 500ml d'eau (ou soluté TVO si ne peut pas boire. Ne pas uriner. Si sonde, la clamber. 1h avant : Boire 250ml d'eau ou soluté TVO si ne peut pas boire. Ne pas uriner. Si sonde, la clamber.		
		ÉCHO PELVIENNE								
		ÉCHO ABDO / PELV	4h avant							
		ÉCHO RÉNALE	4h avant							
		ÉCHO THYROÏDE / DOPPLER A/V								

PRÉPARATION POUR LES EXAMENS DE RADIOLOGIE

LISTE DES ABRÉVIATIONS DU TABLEAU	
ACO	Anticoagulant
Anest	Anesthésie
BS # 18	Bouchon salin et jelco # 18
C+	Avec substance de contraste
CAT	Conduite à tenir
Coag	Coagulation
Cons	Consentement AH-110
Creat (DFGe)	Créatinine (la formule d'estimation du Débit de Filtration Glomérulaire)
FADM	Fiche d'administration des médicaments
INR	International Normalized Ratio
MRCP	Test de résonance cholangio-pancréatique
NPO	Nil per os (rien par la bouche)
P-O-C	Port-o-cath
PT	Temps de prothrombine (TQ=temps de Quick)
PTT	Temps de thromboplastine
TVO	Pour tenir veine ouverte
Voie IV	Voie intraveineuse